Herbizide in Sojabohnen und Lupinenarten (01.2019)

Kultur		Anwendungszeitpunkt	Wirkklasse	Wirkstoff	Gehalt	Mittel	Menge	Preis	Bienen	Gewässer					Saumstruktur		sonstige Auflagen bei der Anwendung	Wirkung																Wartezeit in Tagen
										Hang Randstreifen in m	Abstand in m bei einer Abdriftminderung von				Abstand in m	20 m Spritzbreite bei einer Abdriftminderung von		Fuchsschwanz	Windhalm	Flughafer	Hirse	Vogelknöterich	Windenknöterich	Klette	Kamille	Gänsefuß	Taubnessel	Stiefmütterchen	Ehrenpreis	Vogelmiere	Nachtschatten	Bingelkraut		
Soja-bohne	Lupine				g/l/kg	Zulassung bis:	ha	€/ha		> 2%	0%	50%	75%	90%																			
Herbizide im Vorauflauf																																	
+		VA	C1 K3	Metribuzin Flufenacet	175 240	**Artist** 31.07.2020	2 kg	57	B4	20	5	*	*	*	–	90 %		+++	+++		++(+)	++	+(+)	++(+)	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	F
	+	VA	N	Prosulfocarb	800	**Boxer** 31.10.2020	5 l	52	B4	–	n.e.	n.e.	n.e.	*		90%	NT145 NT146 NT170	+(+)	+++	+	+	+	+	+++	+(+)	+	+++	+	+++	+++	+(+)	+(+)	F
+		VA	F3	Clomazone	360	**Centium 36 CS** 31.12.2025	0,25 l	31	B4	–	*	*	*	*	–	75%	NT127 Temperaturabhängigkeit; NT149 Aufzeichnungen					++	++	+++		+	+++		+(+)	+++	+(+)	++(+)	F
	+	VA	C1 K3	Terbuthylazin S-Metolachlor	187,5 312,5	**Gardo Gold** 31.07.2019	4,0 l	51	B4	10	5	*	*	*	–	75%	NG301-1 Wasserschutzgebietsauflage		++	+(+)	+++	+++	++	+++	++	++	+++	+++	+++	++(+)	+	++	F
+		VA	C1	Metribuzin	600	**Sencor liquid** 31.12.2022	0,4 l	15	B4	10	5	*	*	*	–	50%		++(+)			++(+)		+		+++	++	++(+)	++(+)	++(+)	+++		+	F
+		VA	K3	Dimethenamid-P	720	**Spectrum** 30.10.2019	0,8 l	im Pack	B4	10	5	5	5	*	–	50%		+(+)			+++	+(+)	+(+)		+++	+(+)	+++		++(+)	++	++(+)	+(+)	F
							1,4 l			20	10	5	5	*																			
+	+	VA	K1 K3	Pendimethalin Dimethenamid-P	250 212,5	**Spectum Plus** 31.12.2027	4 l	??	B4	20	n.e.	n.e.	n.e.	5	5	90%	NG405 keine Anwendung auf drainierten Flächen NT145 NT146 NT170	++	+		+++	++(+)	+	++(+)	++	++(+)	++(+)	+++	+++	++(+)	++(+)	++	F
+	+	VA	K 1	Pendimethalin	455	**Stomp Aqua** 31.12.2019	2,6 l	40	B4	*	n.e.	n.e.	n.e.	5	5	90%	NT112 NT145 NT146 NT170	+	+		+	+++	++	++	++(+)	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	++	+(+)	F
Herbizide im Nachauflauf																																	
+		NA	O	Thifensulfuron	480,6	**Harmony SX** 30.06.2019	2 x 7,5 g	je 10	B4	*	*	*	*	*	–	50%	VV603: Keine Verwendung behandelter Pflanzen als Grünfutter					+(+)	+(+)		++(+)	+(+)				+++			F
	nur Gelbe Lupine	NA	C3	Pyridat	450,0	**Lentagran WP** 28.02.2019	2 kg	97	B4	*	*	*	*	*	20	90%								+++	++	++	+++			++(+)	++(+)	+(+)	F
+		NA	O B	Quinmerac Imazamox	250 12,5	**Clearfield-Clentiga** + Dash 31.07.2019	1 l + 1 l	46	B4	*	*	*	*	*	5	75%	NG343 NG354	+				+++	+++	+++		++	++(+)		+++	++(+)	++(+)	+(+)	F
Gramminizide in Nachauflauf																																	
+		NA	A	Cycloxydim	100	**Focus Ultra +** Dash 31.12.2025	2,0 - 2,5 l + 2,0 - 2,5 l	44 - 56	B4	*	*	*	*	*	–	50%		+++	+++	+++	+++												F
							5,0 l (Quecke) + 5 l	112								75%																		
+	+	NA	A	Fluazifop-p-butyl	107	**Fusilade MAX** [1] 31.12.2022	0,75 l - 1,0 l	16- 21	B4	*	*	*	*	*	–	50%		+++	+++	+++	+++												F
							2,0 l (Quecke)	42								90%																		
	+	NA	A	Clethodim + Radiamix	240 654	**Select 240 EC** + Radiamix/Actirob B 31.12.2024	0,5 l + 1,0 l	23	B4	*	*	*	*	*	5	75%		+++	+++	+++	+++												F

n.e. = nicht erlaubt; * = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern; Anwendungsbestimmungen/Auflagen;

+++ = sehr gute Wirkung, ++ = gute bis ausreichende Wirkung, + Teilwirkung

[1] nicht zu Erzeugung von Nahrungsmitteln